

## PRATICA 2

**1) Il guanto sterile non va indossato:**

- a) prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- b) prima del posizionamento di un sondino naso gastrico
- c) prima della medicazione del catetere arterioso
- d) prima del posizionamento del catetere vescicale

**2) Devo somministrare 100 mg di un farmaco per via orale ed ho a disposizione nel carrello il farmaco con dosaggio di 25 mg in compresse divisibili. Quante compresse devo somministrare per raggiungere la dose prescritta?**

- a)  $2 + \frac{1}{2}$  cp
- b) 4 cp
- c)  $4 + \frac{1}{2}$  cp
- d) nessuna delle precedenti

**3) Quale è la sede di elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?**

- a) ventrogluteale
- b) dorsogluteale
- c) rettofermorale o vastofemorale
- d) dorsoventrale

**4) In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi?**

- a) iniezione sottocutanea
- b) iniezione intradermica
- c) iniezione intramuscolare
- d) nessuna delle precedenti

**5) In riferimento alla gestione della stomia è indicato:**

- a) utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomali
- b) utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
- c) detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta

**6) Quale è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?**

- a) regione deltoidea
- b) regione anterolaterale della coscia
- c) regione addominale
- d) tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina

**7) Indicare quali delle seguenti opzioni riferisce le raccomandazioni da osservare per somministrare farmaci per bocca:**

• A)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- disporre in un piattino i farmaci che il paziente dovrà assumere nel corso della sua giornata
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- non lasciare mai i farmaci incustoditi

• B)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- controllare la data di scadenza di ciascuno
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- non lasciare mai i farmaci incustoditi

• C)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- controllare la data di scadenza di ciascuno
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- riporre il carrello in corsia per le ulteriori somministrazioni della giornata

• D)

- nessuna delle precedenti

