

### **PRATICA 3**

**1) Il guanto sterile non va indossato:**

- a) prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- b) prima del posizionamento di un sondino naso gastrico
- c) prima della medicazione del catetere arterioso
- d) prima del posizionamento del catetere vescicale

**2) Devo somministrare 125 mg di un farmaco per via orale ed ho a disposizione nel carrello il farmaco con dosaggio di 75 mg in compresse divisibili. Quante compresse devo somministrare per raggiungere la dose prescritta?**

- a) 2 cp
- b) 1 + ½ cp
- c) 2 + ½ cp
- d) nessuna delle precedenti

**3) Quale è la sede di elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?**

- a) ventrogluteale
- b) dorsogluteale
- c) rettofermorale o vastofemorale
- d) dorsoventrale

**4) Dopo aver inserito un catetere vescicale Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione?**

- a) iniettare della soluzione fisiologica
- b) far defluire l'urina
- c) gonfiare il palloncino
- d) tutte le precedenti

**5) Ordinare correttamente le operazioni da compiere per valutare la frequenza respiratoria**

- a) rilevare un ciclo respiratorio completo
- b) scoprire il torace del paziente
- c) posizionare le braccia del paziente lungo i fianchi
- d) guardare l'orologio e contare la frequenza per 30 secondi
- e) moltiplicare per due

• A)

b,c,a,d,e

• B)

a,c,d,b,e

• C)

b,c,a,d,e

• D)

b,d,a,c,e

**6) Indicare quali delle seguenti opzioni riferisce le raccomandazioni da osservare per somministrare farmaci per bocca:**

A)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- disporre in un piattino i farmaci che il paziente dovrà assumere nel corso della sua giornata
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- non lasciare mai i farmaci incustoditi

B)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- controllare la data di scadenza di ciascuno
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- non lasciare mai i farmaci incustoditi

C)

- lavarsi le mani
- preparare farmaci singolarmente per ogni paziente
- controllare la data di scadenza di ciascuno
- se il paziente ha difficoltà a deglutire, sminuzzare le pillole
- riporre il contenitore della scorta non usata nel cassetto
- riporre il carrello in corsia per le ulteriori somministrazioni della giornata

D)

- nessuna delle precedenti

